

Nidificazioni e tentativi di nidificazione interessanti nella bassa Modenese nel 2010

CARLO GIANNELLA & RAFFAELE GEMMATO

Nel corso del 2010 si sono ripetute nella Bassa Modenese le riproduzioni di specie rare a livello locale, vengono qui tralasciate le riproduzioni di specie oramai regolari quali: Marzaiola *Anas querquedula*, Mestolone *Anas clypeata*, Tarabuso *Botaurus stellaris*, Falco di palude *Circus aeruginosus*, Albanella minore *Circus pygargus*, Grillaio *Falco naumanni*, Falco cuculo *Falco vespertinus*, Lodolaio *Falco subbuteo*, Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*, Sterna comune *Sterna hirundo*.

Volpoca *Tadorna tadorna*. Una coppia è stata ripetutamente osservata senza raccogliere ulteriori indizi, va ricordato che il sito dove la specie si era riprodotta nel 2009 è stato distrutto con lo sbancamento delle vasche dell'ex-zuccherificio di Massa Finalese.

Canapiglia *Anas strepera*. Almeno 2 coppie sono state osservate con regolarità in periodo riproduttivo senza tuttavia osservarne la effettiva riproduzione.

Alzavola *Anas crecca*. Almeno 3 coppie perfettamente volanti sono state osservate con regolarità, senza raccogliere ulteriori indizi.

Moriglione *Aythya ferina*. Almeno una coppia si è riprodotta in un ambiente ad acqua profonda della bassa finalese: una femmina seguita da 5 pulli è stata osservata il 1 luglio assieme ad Ermes Borghi, località dove era presente nella stessa data anche un'altra coppia.

Cormorano *Phalacrocorax carbo*. Nessuna riproduzione avvenuta nel 2010, anche se numerosi immaturi hanno stazionato nelle due garzaie parzialmente allagate della bassa modenese.

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*. La presenza di numerosi esemplari immaturi (a becco giallo) assieme ad altri in abito nuziale (becco nero e piumaggio nuziale completo) nei ripristini caratterizzati da folti canneti allagati e nelle garzaie ripropone la sua possibile riproduzione in zona, senza tuttavia provarla definitivamente.

Airone rosso *Ardea purpurea*. La presenza ripetuta di numerosi adulti in abito nuziale nei ripristini caratterizzati da folti canneti allagati, lascia presupporre la sua possibile riproduzione.

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*. Una coppia si è riprodotta con successo presso Medolla, nei pressi di un parco zoo ove sono presenti nume-

rosi esemplari in cattività.

Mignattaio *Plegadis falcinellus*. Una coppia si è riprodotta all'interno di una garzaia plurispecifica di *A. cinerea*, *E. garzetta*, *N. nycticorax*, *A. rallidoidea* e *B. ibis*. I quattro piccoli, nati tra il 18 (nessun pullo) ed il 25 (almeno 2 pulli), sono stati inanellati con anelli colorati dello schema italiano gentilmente forniti da Stefano Volponi, che qui gentilmente ringraziamo; i pulli all'apparente età di 18-20 giorni, pesavano al momento dell'inanellamento (7 luglio) rispettivamente 380, 450, 495, 500 g rispettivamente. La presente rappresenta la prima nidificazione del modenese dopo oltre 150 anni, la precedente (osservazione di un esemplare giovanissimo nel giugno del 1859, ai confini con il bolognese) viene riportata da DODERLEIN (BRICHETTI, 1982).

Spatola *Platalea leucorodia*. Almeno due coppie hanno provato ad insediarsi nel mese di maggio nella medesima garzaia dove è avvenuta la nidificazione del Mignattaio, ma tali tentativi non hanno dato seguito ad alcuna riproduzione.

Schiribilla *Porzana parva*. Un maschio è stato contattato ripetutamente in maggio-giugno in area idonea alla sua riproduzione.

Avocetta *Recurvirostra avosetta*. Almeno quindici coppie si sono riprodotte nei ripristini parzialmente allagati della bassa modenese.

Gabbiano reale *Larus michaëbellis*. Un numeroso stormo principalmente formato da immaturi e subadulti ha estivato nei ripristini, talvolta con atteggiamenti aggressivi intraspecifici e corteggiamenti ma che non hanno portato all'insediamento di alcuna coppia.

Fratricello *Sternula albifrons*. Almeno sei coppie si sono riprodotte all'interno di un AFV, caratterizzata dalla presenza di numerosi banche di fango.

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*. Scarse se non nulle riproduzioni accertate (< di 10 cp). Questo crollo ha fatto seguito al regolare insediamento a metà di maggio di una numerosa colonia (oltre 100 cp) nelle aree storiche, poi ha metà giugno la colonia è scomparsa (disturbo?).

Calandra *Melanocorypha calandra*. Un maschio cantore è stato ricontattato nella stessa area dove era presente alcuni anni orsono (BRICHETTI & FRACASSO, 2007)

Cappellaccia *Galerida cristata*. Almeno una coppia presente nei terreni sterili limitrofi all'ex-zuccherificio di Massa Finalese.

Bibliografia consultata

BRICHETTI P., 1982 – Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e



Photo G. Sala

La coppia di Mignattaio che si è riprodotta all'interno di una garzaia plurispecifica. Si tratta della prima nidificazione del modenese dopo oltre 150 anni.